

1954年至今2018年，已64年，通過PIC/S GMP，是衛生福利部認可之藥品優良製造商，致力於西藥研發、製造及銷售。

須由醫師處方使



其他微生物製劑 Anti-Pathogenic Microbe Drugs Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|------|--|--------------------------|--|--------------------|
| | 安達定 膠囊 Antadine Cap. 《Protexin》 A032504100 | Amantadine HCl 100mg | 巴金森病預防及治療A型流行性感胃症狀。 每次1粒，每隔6小時服用一次。 | 1000 s/瓶 |
| | 那利敵新 錠 Nalidixic Acid Tab. 《Negacid》 A013180100 | Nalidixic Acid 500mg | 革蘭氏陰性球菌引起的感染症、尿路感染症、細菌性赤痢、腸炎。 每次1-2錠，一日3-4次。 | 100 T/瓶 500 T/瓶 |
| | 舒筋 錠 Sulgin Tab. | Quinine Sulfate 260mg | 抗瘧疾。 瘧疾治療： 每次2錠，一日4次，服用3-7日。 瘧疾抑制： 每次1錠，一日2次，連續6週。 | 100 T/盒 |

磺胺消炎製劑 Sulfonamide Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|------|--|---|--|----------|
| | 美坐磺胺 錠 Sulfamethoxazole Tab. 《Shinomine》 A026205100 | Sulfamethoxazole 500mg | 尿路感染症、淋巴腺炎、手術後感染及其他對磺胺劑有感受性細菌所引起之急患。 初劑量： 每次4錠，其後每隔12小時服用2錠。 | 1000 T/瓶 |
| | 得力免唑 錠 Trimazole Tab. 《Bactrium》 A012951100 | Sulfamethoxazole Trimethoprim 400mg 80mg | 腎、尿路感染、胃腸道感染。 每次2錠，一日2次。 飯後服用。 | 1000 T/瓶 |

營養製劑(含兼製食品級維他命) Therapeutic Nutritional Preparations & Vitamins

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| | 大補鐵 膠囊 Dafuten Cap. 《Niferex-150》 A045974100 | Iron(Polysaccharide Complex) 150mg | 單純性鐵缺乏之貧血症。 每天1-2粒，一日1次。 | 500 s/盒 |

營養製劑(含兼製食品級維他命) Therapeutic Nutritional Preparations & Vitamins

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  | 優利鐵 膠囊 Your Iron Cap. 《Niferex-150 Forte》 A047050100 | R Iron(Polysaccharide Complex) Folic Acid Cyanocobalamin | 150mg 1mg 25mcg | 鐵、葉酸、維生素B12缺乏症。 每次1粒，一日1次。 | 30 s/(彩盒) 500 s/盒 |
|  | 美可 膠囊 Meco Cap. 《Methylcobal》 A035997100 | R Mecobalamin | 0.5mg | 補酵素型維他命B12，治療末梢性神經障礙。 每次1粒，一日3次。 | 100 s/瓶 1000 s/瓶 |
|  | 補葉素 Folic-aid Tab | R Folic Acid | 1mg | 葉酸缺乏症 老人癡呆 | 100 T/瓶 500 T/瓶 |

強肝、利膽、解毒劑 Hepatotonics Cholteretics & Antidotes

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|---|---|------------------------|----------|--|---------------------|
|  | 安奈妥 糖衣錠 Anethol Trithione S.C. Tab. 《Sulfarlem》 A015359100 | R Anethol Trithione | 25mg | 膽囊炎、膽石症、膽道蠕動障礙、急慢性肝炎、肝硬變、膽囊、膽道造影效果之增強。 每次1錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 硫酸阿托品 錠 Atropine Sulfate Tab. N013928100 | R Atropine Sulfate | 0.4mg | 鎮痙劑、有機磷、有機汞製劑之中毒之解毒。 農藥中毒之預防： 農藥使用前服用1~2錠。 農藥中毒之解毒： 每次2~3錠，一日5~6錠。 | 100 T/瓶 1000 T/瓶 |

解熱、鎮痛、非固醇消炎劑

Antipyretics Analgesics & Non-steroid Anti-inflammatory Preparations


| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|---|--|-------------------------|----------|---|--------------------------------|
|  | 伊普 膜衣錠 《Brufen》 *AC43948100 *A0439481G0 | R Ibuprofen F.C.Tab. | *400mg | 慢性風濕性關節炎、關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、腰酸背痛、手術及外傷後的鎮痛及消炎。 每次1錠，一日3次。 | 10 T/盒 1000 T/瓶 1000 T/盒 |
|  | 英得安 膠囊 Intean Cap. 《Indocin》 AC03759100 | R Indomethacin | 25mg | 風濕關節炎、風濕痛。 每次1粒，一日1~3次，飯後立即服用。 | 1000 s/瓶 |

解熱、鎮痛、非固醇消炎劑

Antipyretics Analgesics & Non-steroid Anti-inflammatory Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|---|---|--|--|---------------------|
|  | 克多炎 膠囊 Ketoen Cap. 《Profenid》 AC25231100 | R Ketoprofen 50mg | 類風濕性關節炎、骨關節炎等之鎮痛、消炎。 每次1粒，一日3~4次，飯後立即服用。 | 1000 s/瓶 |
|  | 樂靜痛 錠 Lotinton Tab. 《Sedes》 A020174100 A0201741G0 | R Ethenzamide Acetaminophen Bromvalerylurea Caffeine Anhydrous 200mg 80mg 100mg 25mg | 解熱、鎮熱(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) 每次2錠，一日3次，避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。 | 1000 T/瓶 |
|  | 必得康 膠囊 Pitocam Cap. 《Feldene》 AC25828100 A0258281G0 | R Piroxicam 10mg | 類風濕關節炎、骨關節炎、僵直性脊髓炎急性肌肉骨骼損傷、急性痛風。 (1) 類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：通常成人每天2粒，一次服用。 (2) 急性肌肉骨骼損傷：最初二天每天4粒，一次或分數次服用，而後每天2粒，共服用7天。 | 100 s/盒 1000 s/瓶 |
|  | 必舒痛 錠 Pyston Tab. 《Ponstan》 AC17291100 | R Mefenamic Acid 250mg | 經痛、經血過多、鎮痛、抗炎、解熱。 初劑量： 每次500mg，以後可按需要每隔6小時服用250mg。 | 1000 T/瓶 |
|  | 必舒痛 錠 *AC46756100 | R Mefenamic Acid *500mg | 此劑量如又需要可增加至每次2錠，每天服3次。 | |
|  | 痛達寧 膜衣錠 Tontarin F.C.Tab. 《Voltaren》 AC24103100 | R Diclofenac Sodium 25mg | 緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。 初劑量： 每日100mg~150mg，症狀較輕者及14歲以上青少年每日劑量為：75~100mg；前述用量須分2~3次投予。 | 1000 T/瓶 |
|  | 痛達寧 錠 *AC50260100 | R Diclofenac Sodium *50mg | | |



鎮咳祛痰劑 Antitussives & Expectorants

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|---|--|--|---|----------|
|  | 鹽酸甲基麻黃鹼 錠 dl-Methylephedrine HCl Tab. N009187100 | R dl-Methylephedrine HCl 25mg | 支氣管氣喘、蕁麻疹、鼻炎等過敏性病症、咳嗽、支氣管炎咳嗽。 每次1~2錠，(重症三錠)一日3次。 | 1000 T/瓶 |


抗喘息製劑 Anti-Asthma Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|--|---------------------------------------|---|----------|
|  | 克得喘 錠 Ketozen Tab. 《Zaditen》 A034634100 | ^R Ketotifen Fumarate | 1.38mg 支氣管氣喘。 每次1錠，早餐後及就寢前各1次，一日2次。 | 1000 T/瓶 |

抗組織胺製劑 Antihistamine Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|---|---|---|--|----------|
|  | 塞浦希 錠 Cyproheptadine Tab. 《Periactin》 A017153100 | ^R Cyproheptadine HCl | 4mg 蕁麻疹、濕疹、藥物疹、過敏性皮膚炎、神經性皮膚炎、血管神經性浮腫、枯草熱、鼻炎、支氣管氣喘。 每次1錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 舒孕 膜衣錠 Seulin F. C. Tab. AC48801100 | ^R Doxylamine Succinate Pyridoxine HCl | 10mg 10mg 妊娠婦之噁心及嘔吐之緩解。 睡前服用2錠，嚴重之患者或白天也發生病況之患者，可於早晨及午後各追加服用1錠。 | 1000 T/瓶 |

精神安定、催眠製劑 Tranquilizers, & Hypnotic Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|---|-------------------------------|--|----------|
|  | 氯美查諾 錠 Chlormezanone Tab. 《Trancopal》 A013118100 | ^R Chlormezanone | 100mg 腰痛、肩酸痛、脊椎分離症、手術後肌痛、四肢肌肉痙攣、僵硬。 每次1-2錠，一日3-4次。 | 1000 T/瓶 |


腸胃炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparation

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|--|----------------------------|---|--------------------------------|
|  | 胃適康 膜衣錠 Isacan F.C. Tab. 《Tagamet》 AC24957100 *AC36662100 *A0366621G0 | ^R Cimetidine | 200mg *400mg 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、反流性食道炎、胃泌素瘤症候群、胃炎、胃酸過多症。 每次1-2錠，一日3-4次，與餐一起服用。 | 100 T/盒 100 T/瓶 1000 T/瓶 |




腸胃炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparation

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|--|--------------------------------|--|----------|
|  | 美普朗 糖衣錠 Mepram S.C.Tab. 《Primperan》 A021622100 | ^R Metoclopramide | 3.84mg 預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。 每次2錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 胃益寧 膜衣錠 Wyeantin F.C.Tab. 《Motilium》 A032490100 | ^R Domperidone | 10mg 噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。 每次1錠，一日3~4次。 | 1000 T/瓶 |


消化整腸止痢製劑 Antidiarrheal Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|  | 益痢寧 膠囊 Elinin Cap. 《Imodium》 AC22586100 A0225861G0 | ^R Loperamide HCl | 2mg 急慢性腹瀉。 (1) 急性腹瀉：成人初劑量2粒，其後每次1粒。 (2) 慢性腹瀉：成人初劑量每天2粒，一日2次。 | 100 s/盒 100 s/瓶 1000 s/瓶 |

副腎皮質荷爾蒙製劑 Adrenal Cortex Hormone Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------|
|  | 貝他美松 錠 Betamethasone Tab. 《Rinderon》 AC13796100 | ^R Betamethasone | 0.5mg 腎炎症候群、蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次，或依症狀適宜增減。 | 1000 T/瓶 |
|  | 卡拿隆 錠 Canalon Tab. 《Decadron》 NC16499100 | ^R Dexamethasone | 0.5mg 腎炎症候群、蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次，或依症狀適宜增減。 | 100 T/瓶 1000 T/瓶 |
|  | 博力寧 錠 Preinin Tab. (橢圓) 《Prednin》 AC08715100 | ^R Prednisolone | 5mg 蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次或依症狀適宜增減。 | 100 T/瓶 1000 T/瓶 |
|  | 普力安寧 錠 Preanin Tab. (白圓) 《Prednin》 | ^R Prednisolone | 5mg 急性感染疾患 (與抗生素併用) 蕁麻疹、灼傷、創傷的休克、風濕性關節炎、氣喘症、皮膚炎。 每次1錠，一日3~4次或依症狀適宜增減。 | 1000 T/瓶 |


血液循環系統治療劑 Blood Circulatory System Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|--|--------------------------------|---|----------|
|  | 諧平 錠 Cepin Tab. 《Cephadol》 AC26284100 | ^R Diphenidol HCl | 25mg 美尼艾氏症候群、中、內耳手術(內耳炎)之眩暈、噁心及嘔吐、手術後、惡性腫瘤及內耳迷路障害之噁心及嘔吐。 每次1-2錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |

強心劑利尿、降血壓劑 Coronary Arteries Dilator Diuretics Antihypertensive

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------|
|  | 待匹力達 糖衣錠 Dipyridamole S.C.Tab. 《Persantin》 AC19138100 | ^R Dipyridamole | 25mg 對於慢性狹心症之治療可能有效。 每次1錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 雙氫化氯噻治 錠 Hydrochlorothiazide Tab. 《Dichlotride》 AC14346100 | ^R Hydrochlorothiazide | 25mg 利尿、高血壓。 每次1-4錠，一日1-2次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 易舒平 錠 Isoperdine Tab. 《Isoptin》 AC33822100 | ^R Verapamil HCl | 40mg 狹心症。 每次1-2錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |
|  | 健心寧 錠 Propranolol Tab. 《Inderal》 AC19192100 | ^R Propranolol HCl | 40mg 狹心症不整律(上心室性不整律、心室性心搏過速)原發性及腎性高血壓、偏頭痛、控制原發性震顫、控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親絡細胞瘤。 每次1/4-1錠，一日3-4次，於飯前服用。 | 1000 T/瓶 |
|  | 亞羅普寧 錠 Alloprim Tab. AC18705100 | ^R Allopurinol | 100mg 痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。 初劑量:100mg，一日1次。 維持劑量:100mg-200mg，一天2-3次。 | 100mg 100 T/瓶 1000 T/瓶 |
|  | 亞羅普寧 錠 *AC47922100 | ^R Allopurinol | *300mg 300mg單一劑量一日1次。 | 300mg 1000 T/瓶 |

酵素製劑 Medicine Enzyme Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|--|----------|
|  | 來縮酵素 錠 Lysozyme Tab. A024758100 | ^R Lysozyme Chloride | 90mg | 慢性副鼻腔炎、呼吸器疾患的喀痰困難症狀、小手術時的術中術後出血(齒科、泌尿科方面)。 每次1錠，一日3次。 | 1000 T/瓶 |

抗結核製劑 Tuberculostatic Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|--|---|---------------------------|----------|---|---|
|  | 異菸鹼醯肼 錠 Isoniazid Tab. 《INAH》 NC13929100 N0139291G0 *AC48038100 *A0480381G0 | ^R Isoniazid | 100mg | 肺結核，喉頭結核，腸結核，膀胱結核，皮膚結核，結核性髓膜炎，結核性膿胸，腎臟結核。 急性結核病： 成人每天單劑量5mg/kg(最大量為300mg/天) 預防：成人一日300mg單劑量。 | 100mg 100 T/瓶 1000 T/瓶 300mg 1000 T/瓶 |
| | | ^R | *300mg | | |

陰道毛滴鞭蟲治療劑 Trichomonacides

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|--|---|-------------------------------|----------|--|---------|
|  | 咪唑尼達 膠囊 Metronidazole Cap. 《Flagyl》 AC13664100 A0136641G0 | ^R Metronidazole | 250mg | 治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴肝膿腫及對Metronidazole具有感受性之厭氣菌所引起之嚴重感染。 每次1粒，男人一日2次，女人一日3次，飯後服用連續服用十日。 | 500 s/瓶 |

外用製劑 External Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 | |
|--|---|---|----------------|---|---|
|  | 倍膚寧 凝膠 (清涼配方) Befurine Gel, 0.05% AC43913329 / 10gm AC43913338 / 20gm | ^R 每公克含 Clobetasol propionate | 0.5mg | 牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。 每日使用1次~數次塗抹，(增減)輕擦於患部，情況改善後即應停止用藥。 | 450gm(預訂) 10gm/支 20gm/支 25gm/支 |
|  | 克黴速 乳膏 Clobe Cream AC43215329 / 10gm | ^R 每公克含 Clotrimazole Betamethasone dipropionate | 10mg 0.64mg | 足癬、股癬、體癬。 每天早晚，均勻塗抹於患部及其周圍，一天使用2次。 | 10gm/支 |
|  | 扶得康 軟膏 Futocan Cream 《Flucor》 AC20926329 | ^R 每公克含 Fluocinolone Acetonide | 0.25mg | 急、慢性濕疹、乳幼兒濕疹、接觸性皮炎、神經性皮炎、皮膚搔癢症、蕁麻疹、藥物疹、乾癬、水泡、蟲咬傷。 將患部清拭後，一日2~4次塗擦。 | 10gm/支 |

外用製劑 External Preparations

| 藥品外觀 | 品名/健保碼 | 成份 (每錠/粒含) | 適應症/用法用量 | 包裝 |
|---|--|-----------------------|---|---|
|  | 美膚達 凝膠 Mefudazole Gel, 0.75% AC40815329 / 10gm AC40815338 / 20gm | 每公克含 Metronidazole | 7.5mg 因酒糟鼻引起發炎性丘疹、膿皰、紅腫。 使用本品前，先用溫水及中性肥皂清洗患部後再輕輕塗抹本品於患處，一天分早、晚二次使用。 | 10gm x 144/支 10gm/支 20gm/支 450gm/瓶 |
|  | 美婦寧 陰道用凝膠 Mefugel Vaginal Gel, 0.75% AC44675540 / 25gm AC44675596 / 35gm | 每公克含 Metronidazole | 7.5mg 治療細菌陰道炎 每天1-2次，連續5天，將陰道凝膠置入陰道內。(附施藥器) | 25gm/支 35gm/支 |
|  | 德克娜 陰道用乳膏 Terconer Vaginal Cream 0.8% AC47308538 | 每公克含 Terconazole | 8mg 治療外陰部及陰道念珠菌感染。 將本劑5公克(含主成份40MG)充填於施藥器導入陰道內深處，每日就寢時間，連續3晚。(附施藥器) | 20gm/支 |
|  | 愛雅漾 凝膠 Adayung Gel, 0.1% AC49062321 / 5gm AC49062335 / 15gm | 每公克含 Adapalene | 1mg 治療尋常性痤瘡。 凝膠劑須於休息前及洗臉後每日一一次施用於痤瘡患部，施一層凝膠薄膜。 | 450gm/瓶 15gm/支 |



“信隆” 6 Tabs.
旅伴® 嚼錠
Lipan
 Chewable Tablets
 暈船 暈車 嘔吐

健痢
 Jiann Lih Capsules
 腹瀉、腸炎、腹痛
 腸內異常酸酵
 12 Capsules

信隆夜舒寧
 YES-Z Capsules *S.L.*
 緩解入睡困擾

優利鐵
 Your Iron Capsules *S.L.*
 三價鐵 葉酸 維生素B₁₂

鎮咳祛痰
 Antitussives Expectorants
 風哪安
 Kanfonan Capsules *S.L.*
 咳嗽、痰多、發熱、喉痛、氣管炎、肌肉痠痛、流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、喉嚨、喉痛

舒清
 Sucin Troches
 檸檬口味 喉錠
 20錠
 咽喉痛
 及發炎之緩解